NeoCitran rhume et grippe nuit

Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants avant chaque utilisation.

Indications: Pour un soulagement temporaire des symptômes suivants dus au rhume et à la grippe: les maux de gorge, les maux de tête, les douleurs et les courbatures légères, la fièvre et les frissons, la congestion nasale et la congestion des sinus, l'écoulement nasal, les éternuements, les picotements et les larmoiements des yeux.

Mode d'emploi: Adultes et enfants de 12 ans et plus: Dissoudre le contenu de 1 sachet dans 225 mL (une tasse) d'eau bouillante. Peut être pris toutes les 4 à 6 heures. Ne jamais dépasser un maximum de 4 doses par jour. Enfants de moins de 12 ans: Ne pas administrer.

Ingrédients actifs: Chaque sachet contient:
ANALGÉSIQUE: Acétaminophène 325 mg
DÉCONGESTIONNANT: Chlorhydrate de phényléphrine 10 mg
ANTIHISTAMINIQUE: Maléate de phéniramine 20 mg

Ingrédients non médicinaux: Acide ascorbique, acide citrique, acide malique, citrate de sodium, dioxyde de titane, jaune D et C n° 10, jaune FD et C n° 6, saccharose, saveurs, tribasic phosphate de calcium.

Mise en garde: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. POUR ADULTES SEULEMENT. NE PAS dépasser la dose recommandée sans l'avis d'un médecin. Dépasser la dose quotidienne maximale comporte un risque d'atteintes hépatiques graves ou mortelles. Consulter un médecin et cesser l'utilisation si les symptômes persistent pendant plus de 5 jours, la fièvre dure plus de 3 jours ou les maux de gorge plus de 2 jours, si la toux empire ou est accompagnée d'une forte sécrétion (mucosités) ou d'une forte fièvre (>38 °C); ou si des réactions allergiques comme une respiration sifflante, une éruption cutanée ou une démangeaison se manifestent. Consulter un médecin avant de prendre ce médicament si vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'une maladie pulmonaire chronique, ou bien d'une maladie du coeur ou de la thyroïde, d'une maladie grave du foie ou des reins, ou encore si vous êtes atteint de diabète ou de glaucome ou si vous avez de la difficulté à uriner à cause d'une hypertrophie de la prostate; si vous prenez d'autres médicaments, y compris des produits de santé naturels ou des médicaments sur ordonnance, particulièrement s'ils contiennent de l'acétaminophène, des salicylates ou d'autres médicaments contre la douleur et la fièvre (AINS); en cas d'alcoolisme chronique ou bien si vous êtes une personne âgée, enceinte ou qui allaite. **NE PAS UTILISER** avec un autre produit ou médicament contre la toux et le rhume ou avec un autre médicament contenant de l'acétaminophène, si vous êtes allergique à l'acétaminophène ou à d'autres ingrédients du produit, ou si vous prenez ou avez pris au cours des deux dernières semaines des inhibiteurs de la monoamine-oxydase. Peut occasionner de la somnolence ou de l'excitabilité. Éviter les boissons alcoolisées, les sédatifs ou tranquillisants; ne pas conduire de véhicule et ne pas entreprendre d'activités exigeant de la vigilance.

En cas de surdosage: Communiquer immédiatement avec un médecin ou un centre antipoison, même en l'absence de signes ou de symptômes dans les premières 24 heures comme une transpiration abondante, de la nausée, des vomissements, des douleurs à l'estomac et une perte d'appétit. Entreposer les sachets inviolables à l'épreuve des enfants hors de leur portée à la température de la pièce.

®TM/MC Novartis Consumer Health Canada Inc.
Mississauga, ON L5N 0C2 © 2013
Questions: 1-888-788-8181